SYNLAB

www.synlab.pt

SARS-CoV-2 (COVID-19), Pesquisa de Ag automatizado (Diasorin)

Procedimento para a realização de colheita de exsudado nasofaríngeo e envio ao laboratório

Os profissionais de saúde que realizem colheitas de produtos biológicos devem utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou equivalente, segundo as normas em vigor (ver ITC-100).

1. Receção do cliente

Assinale o nome do cliente na lista de inscrições.



Confirme sempre a identificação do utente (nome e a data de nascimento). Identifique a folha de colheita com etiqueta de código de barras do utente, e com data, hora e assinatura do profissional de saúde.

Desinfete devidamente as mãos com álcool.

2. Colheita de exsudado nasofaríngeo

Cole a etiqueta no tubo, conforme a figura.



Introduza a zaragatoa na narina direita, o mais profundo possível, rodando contra a mucosa.



Introduza a mesma zaragatoa na narina esquerda, o mais profundo possível , rodando contra a mucosa.

Coloque a zaragatoa no tubo com tampão de inativação e quebre a haste. Se necessário, dobre a haste de forma a não pressionar a tampa. Feche bem o tubo com a tampa.

3. Envio ao Laboratório

Coloque o tubo no suporte. Os suportes com as amostras devem ser colocados na mala de transporte Amostras biológicas da SYNLAB com termoacumuladores refrigerados.

Feche a mala de transporte. Coloque a folha de registo de colheitas e a lista de inscrições dentro da pasta para o efeito Entregue a mala e pasta ao estafeta (não colocar a pasta dentro da mala), de acordo com as rotas.

SYNLAB

www.synlab.pt

SARS-CoV-2 (COVID-19), Pesquisa de Ag automatizado (Siemens)

Procedimento para a realização de colheita de exsudado nasofaríngeo e envio das amostras ao laboratório. As etapas que diferem do procedimento Diasorin estão assinaladas a rosa.

Os profissionais de saúde que realizem colheitas de produtos biológicos devem utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou equivalente, segundo as normas em vigor (ver ITC-100).

1. Receção do utente

Assinale o nome do cliente na lista de inscrições.



Confirme sempre a identificação do utente (nome e a data de nascimento). Identifique a folha de colheita com etiqueta de código de barras do utente, e com data, hora e assinatura do profissional de saúde.

Desinfete devidamente as mãos com álcool.

2. Colheita de exsudado nasofaríngeo

Cole a etiqueta no tubo, conforme a figura.



Introduza a zaragatoa na narina direita, o mais profundo possível, rodando contra a mucosa.



Introduza a mesma zaragatoa na narina esquerda, o mais profundo possível , rodando contra a mucosa.

Coloque a zaragatoa no tubo com tampão e quebre a haste. Se necessário, dobre a haste de forma a não pressionar a tampa. Feche bem o tubo com a tampa.

3. Envio ao Laboratório

Coloque o tubo dentro de um saco de plástico etiquetado com código de barras.

Coloque o tubo no suporte. Os suportes com as amostras devem ser colocados na mala de transporte Amostras biológicas da SYNLAB com termoacumuladores refrigerados.

Feche a mala de transporte. Coloque a folha de registo de colheitas e a lista de inscrições dentro da pasta para o efeito Entregue a mala e pasta ao estafeta (não colocar a pasta dentro da mala), de acordo com as rotas.